

Serie 3

1. Betrachte die Fläche $\{xyz = 1\} \subset \mathbb{R}^3$, und berechne die Hauptkrümmungen im Punkt $(1, 1, 1)$.
2. Betrachte die Krümmung einer gegebenen Fläche $S = f(U)$ in einer Tangentialrichtung an einem Punkt p .
 - a) Zeige, daß für jede zwei zueinander orthogonalen Richtungen die Summe der zugeordneten Richtungskrümmungen den gleichen Wert hat.
 - b) Es sei $X_o \in T_p S$ eine feste Richtung und $\kappa(\vartheta)$ die Krümmung in der Richtung X_ϑ , wobei der Winkel zwischen X_ϑ und X_o gleich ϑ ist. Zeige:

$$H = \frac{1}{\pi} \int_0^\pi \kappa(\vartheta) d\vartheta.$$

3. Es sei $f: U \rightarrow \mathbb{R}^3$ ein parametrisiertes Flächenstück und $c: I \rightarrow S = f(U)$ eine Asymptotenkurve mit nirgends verschwindender Krümmung.
 - a) Betrachte die Schmiegeebene von c an der Stelle $c(t)$, d.h. aufgespannt von Geschwindigkeit und Normale der Kurve c . Zeige, daß die Schmiegeebene an jedem Punkt $c(t)$ mit dem Tangentialraum $T_{c(t)} S$ der Fläche übereinstimmt.
 - b) Zeige, daß die Torsion τ der Kurve c und die Gauß-Krümmung von S bei allen Punkten von c die Gleichung

$$\tau^2 = -K$$

erfüllt.

Rückgabe: In Absprache mit Übungsleiter.